Il ciclo idrologico globale *M. Marani*

Il ciclo idrologico

Gli oceani sono la sorgente principale di vapore che circola nel ciclo idrologico e alimentano la precipitazione sui continenti

(Fonte NRC)

Gli oceani sono la sorgente principale di vapore che circola nel ciclo idrologico e alimentano la precipitazione sui continenti

(Fonte NRC)

Gli oceani sono la sorgente principale di vapore che circola nel ciclo idrologico e alimentano la precipitazione sui continenti

(Fonte NRC)

Gli oceani sono la sorgente principale di vapore che circola nel ciclo idrologico e alimentano la precipitazione sui continenti

Collocazione dei volumi d'acqua nel ciclo idrologico

Riserva	Volume (10⁶ km³)	Percentuale del totale
Oceani	1370	97,25
Ghiacciai	29	2,05
Acque sotterranee	9,5	0,68
Laghi	0,125	0,01
Umidità del suolo	0,065	0,005
Atmosfera	0,013	0,001
Corsi d'acqua	0,0017	0,0001
Biosfera	0,0006	0,00004

Collocazione dei volumi d'acqua nel ciclo idrologico

Ghiacciai

Acque sotterranee

Acque superf.

Atmosfera

Oceani

Tempi medi di residenza

Riserva	Tempo di residenza
Antartide	20.000 anni
Oceani	3.200 anni
Ghiacciai	20 - 100 anni
Neve stagionale	2 - 6 mesi
Umidità del suolo	1 - 2 mesi
Acque sotterranee superficiali	100 - 200 mesi
Acque sotterranee profonde	10.000 anni
Laghi	50 - 100 anni
Fiumi	2 - 6 mesi
Atmosfera	9 giorni

Tempi medi
Riserva
Antartide
Oceani
Ghiacciai
Neve stagionale
Umidità del suolo

di residenza
anni
anni
0 anni
esi
esi

Acque sotterranee superficiali 100 - 200 mesi

Acque sotterranee profonde 10.000 anni

Laghi 50 - 100 anni

Fiumi 2 - 6 mesi

Atmosfera 9 giorni

Qualche elemento storico

Primi canali di irrigazione in Mesopotamia: 7000-6000 A.C.

Agricoltura in Egitto da ca. 5000 A.C., gestione delle piene del Nilo

Primo documento scritto su gestione risorse idriche: Uruk - tavoletta ca. 3300 A.C. che menziona la necessità di *'pulire i canali di irrigazione più piccoli'*

Dighe in terra e pietre in Mesopotamia 4000-3000 A.C.

Yu Il Grande in Cina nel 2000 A.C.: *'Condusse i Fiumi al mare, come i nobili alla corte'*

Impero romano: dighe ed acquedotti

*Diga di Cornalvo
Spagna - II Sec DC*

*Acquedotto di
Nimes
Francia I sec DC*

Whitcher et al., WRR, 2002

'Nilometri'

Isola Elefantina

Toussoun, 1922

Hurst, 1927

Principali fattori che influenzano il ciclo idrologico (ovvero modi nei quali l'uomo può interferire con esso):

- Radiazione solare incidente;**
- Aerosol atmosferici (naturali e antropogenici);**
- La temperatura superficiale (gas serra!);**
- Serbatoi artificiali e irrigazione;**
- Impermeabilizzazione delle superfici;**
- Attingimento dalle falde con tassi elevati (sostenibilità)**

Principali fattori che influenzano il ciclo idrologico (ovvero modi nei quali l'uomo può interferire con esso):

- Radiazione solare incidente;**
- Aerosol atmosferici (naturali e antropogenici);**
- La temperatura superficiale (gas serra!);**
- Serbatoi artificiali e irrigazione;**
- Impermeabilizzazione delle superfici;**
- Attingimento dalle falde con tassi elevati (sostenibilità)**

Intensità del ciclo idrologico e sue variazioni

$$P - ET = 46 \cdot 10^3 \text{ Gm}^3/\text{yr}$$

$$\text{Avvezione} = 46 \cdot 10^3 \text{ Gm}^3/\text{yr}$$

$$ET - P = 46 \cdot 10^3 \text{ Gm}^3/\text{yr}$$

Continenti

$$Q_t = 46 \cdot 10^3 \text{ Gm}^3/\text{yr}$$

Oceani

Intensità del ciclo idrologico e sue variazioni: se il ciclo idrologico accelera i flussi (P,ET, Q) devono aumentare

L'accelerazione del ciclo idrologico

Variazione della precip. nel prossimo secolo (IPCC, 2007)

Precipitation A1B: 2080-2099 DJF

La serie secolare di precipitazione misurata a Padova (1725-)

LA SPECOLA

G. Poleni

7	N	0		Vario
12	E	0		Vario
5	E	0	50	sereno
4	N	0		sereno
6	N	0	4	Nuvola
4	N	0		Nuvola
2	S	0	31	sereno
4	SW	0		Vario
0	SW	0		Vario
2	E	0	1	Variabile
7	SW	0		Vario
2	E	1		Nuvola
4	E	0	37	Vario
2	E	1		Nuvola
8	E	1		Nuvola
1	E	1	122	Vario
3	SE	1		Vario
7	SE	0		Vario
1	W	0		Nuvola
19	W	0		Nuvola
4	W	0		sereno
4	W	0		sereno
9	W	1		sereno

Pioggie a Padova: medie annuali

Piogge a Padova: precipitazioni con $T_r=100$ anni

Principali conseguenze di un accelerato ciclo idrologico:

- Minore infiltrazione e ricarica delle falde regionali**
- Maggiore deflusso superficiale e più intensi eventi di piena**
- Minore disponibilità di risorsa idrica;**

Riduzione delle risorse idriche sotterranee

**Attingimenti dalla falda in % rispetto alla ricarica
(International Groundwater Resources Assessment Center, 2004)**

Riduzione del risorse idriche sotterranee

Riduzione delle risorse idriche sotterranee

Configurazione anni '60:

Infiltrazione= $1.3 \cdot 10^3 \text{ Gm}^3/\text{yr}$

Riduzione delle risorse idriche sotterranee

Configurazione XXI secolo:

Infiltrazione = $1.3 \cdot 10^3 \text{ Gm}^3/\text{yr}$

Riduzione delle risorse idriche sotterranee

Configurazione XXI secolo con riduzione infiltrazione:

Infiltrazione = $1.2 \cdot 10^3 \text{ Gm}^3/\text{yr}$

Variazioni della ricarica della falda regionale

Telerilevamento ed uso del suolo

Legenda		Acqua
Inclassificato		Terreni agricoli
Bosco		Prato
Nuvole		Ghiaia
Sup. impermeabili		

Volumi totali annui dal 1987 al 2002:

- Diminuzione del 6% dell'infiltrazione
- Diminuzione del 7% della ricarica
- Aumento del 14% del deflusso superficiale

Aumento delle aree impermeabili del 31% tra il 1987 e il 2002

1987

Usi dell'acqua estratta dalla falda (International Groundwater Resources Assessment Center, 2004)

Impronta idrica

L'utilizzo maggiore di acqua nel mondo è per la produzione di beni (cibo, carta, contone, ecc.)

16000 litres water

1 kg beef

900 litres water

1 kg maize

140 litres water

1 cup of coffee

Importazioni nette di acqua virtuale

Figure 4.5. National virtual water balances related to the international trade of products. Period 1997-2001.

Impronta idrica di diversi cibi e diete

1 kg pasta = 1924 litri d'acqua

Pizza Margherita da 725 g = 1216 litri d'acqua

(Aldaya e Hoekstra, 2010)

Dieta di carne	Kcal/giorno	litri/kcal	litri/giorno	Dieta vegetariana	Kcal/giorno	Litri/kcal	Litri/giorno
Origine animale	950	2,5	2375	Origine animale	300	2,5	750
Origine vegetale	2450	0,5	1225	Origine vegetale	3100	0,5	1550
Totale	3400		3600	Totale	3400		2300

(Hoekstra, 2010)

Impronta idrica individuale: 2000-2500 m³/anno

http://www.waterfootprint.org/index.php?page=cal/waterfootprintcalculator_indv

Conclusioni

- 'Piccole' variazioni del ciclo idrologico inducono importanti conseguenze socio-economiche;
- L'uomo può influenzare in modo decisivo il ciclo idrologico a scala globale;
- Principali influenze antropogeniche: riscaldamento globale, impermeabilizzazione delle superfici, sfruttamento non sostenibile delle risorse, inquinamento delle risorse;
- Principali effetti attesi: riduzione delle risorse disponibili; aumento della frequenza e dell'entità degli eventi di piena;
- Lo stile di vita collettivo ed individuale ha un effetto decisivo sulla possibilità di conservare le risorse idriche per le generazioni future

Figura 3 – Precipitazione cumulata dal 31 ottobre al 2 novembre 2010

Fonte: Centro Funzionale decentrato
 Protezione Civile
 ARPAV

**Fonte: Centro
Funzionale decentrato
Protezione Civile
ARPAV**

Figura 5. Carta delle differenze delle precipitazioni (mm) registrate in due giorni, tra l'evento del 31 ottobre-1 novembre 2010 e quello del 4-5 novembre 1966.

Tempi di Ritorno

14	VENE-B	VI	Asiago (aeroporto)	4	17	> 50	> 50
23	VENE-B	VI	Pedescala	3	5	20	15
18	VENE-B	VI	Brustole' Velo d'Astico	7	20	48	23
22	VENE-B	VI	Castana (Arsiero)	12	41	> 50	> 50
23	VENE-B	VI	Contra' Doppio Posina	7	19	25	20
18	VENE-B	VI	Lusiana	5	> 50	> 50	> 50
12	VENE-B	VI	Marcesina	3	13	> 50	> 50
18	VENE-B	VI	Molini Laghi	13	20	24	14
19	VENE-B	VI	Monte Summano	2	5	> 50	> 50
18	VENE-B	VI	Passo Santa Caterina Valdagno	5	22	46	> 50
18	VENE-B	VI	Passo Xomo Posina	21	> 50	> 50	38
22	VENE-B	VI	Pove del Grappa loc. Pra' Gollin	4	22	> 50	> 50
22	VENE-B	VI	Recoaro 1000	8	38	> 50	> 50
18	VENE-B	VI	Rifugio la Guardia (Recoaro)	5	16	31	24
23	VENE-B	VI	Turcati Recoaro	7	22	48	45
22	VENE-B	VI	Valdagno	5	17	50	> 50
18	VENE-B	VI	Valli del Pasubio	18	> 50	> 50	45

**Fonte: Centro Funzionale decentrato
Protezione Civile
ARPAV**